

TENSIFLEX®
Comprimidos

**Analgésico miorrelajante
(Clorzoxazona, Paracetamol)**

COMPOSICIÓN: Cada COMPRIMIDO RECUBIERTO de TENSIFLEX contiene 250 mg de clorzoxazona y 300 mg de Paracetamol.

INDICACIONES: TENSIFLEX está indicado en todos los casos de alteraciones agudas del sistema muscular esquelético que se caracterizan por dolor, rigidez, ya sea de origen inflamatorio, postraumático, degenerativo o por secuelas espásticas musculares. Calambres musculares.

POSOLÓGÍA: La dosis de TENSIFLEX deberá ser establecida por el médico, en relación con el cuadro clínico. En general, se recomienda: adultos, 1 o 2 comprimidos 4 veces al día, máximo 8 comprimidos cada 24 horas. En niños mayores de 12 años, 1 comprimido 4 veces al día.

CONTRAINDICACIONES: Antecedentes de hipersensibilidad al paracetamol o a clorzoxazona.

Miastenia gravis, insuficiencia hepática, embarazo y lactancia.

INTERACCIONES: No debe administrarse conjuntamente con alcohol, depresores del SNC o inhibidores de la MAO. No utilizar junto con anticoagulantes orales.



EFFECTOS SECUNDARIOS: En general, TENSI-FLEX es bien tolerado. Ocasionalmente pueden presentarse somnolencia, mareos o cefaleas. Con menos frecuencia: constipación, diarreas, pirosis, y urticaria. Se han reportado casos de excitación y nerviosismo.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: Información toxicológica a su disposición en la Dirección Médica de Laboratorios Bagó.

PRESENTACIÓN: TENSIFLEX **comprimidos**. Caja x 10 **comprimidos** y caja x 200 **comprimidos**.

Información complementaria a su disposición en la Dirección Médica de Laboratorios Bagó.

LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.

Quito: Lizardo García E1080 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón.

T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401

Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec

www.bago.com.ec

