(1/2)

nt

ati

a s

l

N

l

ts

Fecha:

10 mm

Zona tassativa Senza testo

Dislep® 25

levosulpiride

Acción farmacológica

DISLEP 25 (levosulpiride) es un agente procinético digestivo con actividad a distintos niveles del tracto gastrointestinal en base de un mecanismo específico sobre receptores de Dopamina y Serotonina. Dislep aumenta el tono del esfínter esofágico y facilita el vaciado gástrico. Normaliza el tránsito intestinal y normaliza el peristaltismo.

Composición

El principio activo es levosulpiride 25 mg por comprimido.
Los demás componentes son: lactosa monohidrato, almidón glicolato sódico, celulosa microcristalina y estearato de magnesio.

Indicaciones

Se utiliza para el tratamiento de alteraciones digestivas en las que se necesita estimular la motilidad gastrointestinal cuando no han respondido a las medidas higiénico-dietéticas.

Posología

Siga exactamente las instrucciones de administración de Dislep indicadas por su médico.
Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.
La dosis normal en adultos es de 1 comprimido (25 mg de levosulpiride) cada 8 horas, es decir 3 comprimidos (75 mg de levosulpiride) al día por vía oral, repartidos en tres tomas, al menos 20 minutos antes de las comidas. Los comprimidos de Dislep se tragan enteros con una cantidad suficiente de agua, y no deben romperse ni masticarse.

Su médico le indicará la duración del tratamiento con Dislep.
Uso en niños: No está indicado el uso de levosulpiride en niños.
Uso en ancianos: En los pacientes ancianos, la dosis diaria de Dislep será establecida por el médico en función de las necesidades del paciente.

Contraindicaciones

- Si es alérgico (hipersensible) a levosulpiride o a cualquiera de los demás componentes de Dislep.
- Si es epiléptico o tiene historial de estados convulsivos o psicosis de tipo maníaco-depresivas.
- Si tiene riesgo o padece hemorragia, obstrucciones o perforaciones a nivel gastrointestinal.
- Si padece feocromocitoma (tumor de la glándula suprarrenal).
- Si está diagnosticado de mastopatía (afección mamaria) maligna.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento. No existen datos sobre el efecto de este medicamento en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, por lo que no se recomienda la utilización de Dislep en estos casos.

Precauciones de empleo

Si cree que los movimientos intestinales le pueden producir molestias, consulte a su médico.

Toma de Dislep con los alimentos y bebidas

No tome alcohol si está en tratamiento con Dislep.
Tome Dislep al menos 20 minutos antes de las comidas.

Interacciones

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Ciertos medicamentos pueden interaccionar con Dislep. En estos casos puede resultar necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con alguno de los medicamentos.

Es especialmente importante que informe a su médico si toma uno de los siguientes fármacos

- Medicamentos para el dolor (narcóticos, analgésicos).
- Anticolinérgicos y antidopaminérgicos, pregunte a su médico su tiene dudas.

Efectos sobre la capacidad de conducir y sobre el uso de maquinaria

Levosulpiride puede producir síntomas tales como, somnolencia, mareo, alteraciones en la vista y disminución la capacidad de reacción. Estos efectos así como la propia alteración digestiva, pueden dificultar su capacidad para conducir vehículos o manejar máquinas. Por lo tanto no conduzca ni maneje máquinas ni practique otras actividades que requieran especial atención, hasta que su médico valore su respuesta a este medicamento.

Efectos indeseables

Al igual que todos los medicamentos, Dislep puede producir efectos adversos aunque no todas las personas los sufran.
Muy frecuentes (al menos 1 de cada 10 pacientes): ronquera, calambres abdominales, aumento de peso, hipersalivación (aumento en la secreción de saliva), insomnio, estreñimiento, vértigo y/o fatiga.
Frecuentes (al menos 1 de cada 100 pacientes) somnolencia, sedación, tensión mamaria, alteraciones menstruales, galactorrea (secreción mamaria), ginecomastia (aumento del tamaño mamario).
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Sobredosificación

Los síntomas por sobredosis de Dislep son principalmente somnolencia y temblores. De producirse debe de ponerse en contacto con el médico.

Presentación

Envase de 20 comprimidos de 25 mg.

Información importante sobre algunos de los componentes de Dislep

Lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
Sodio: Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1 mmol) por dosis, esto es, esencialmente exento de sodio.
Conservar a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la humedad excesiva.

Si olvidó tomar Dislep

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Se recomienda consultar a su médico o farmacéutico.

Si interrumpe el tratamiento con Dislep

No suspenda el tratamiento indicado por su médico, ya que no se logrará el efecto previsto.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
No utilice Dislep después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

Fabricado por: **DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.**, Rozzano(Milán)-Italia
Para: **Ferrer Internacional, S.A.** Gran Vía Carlos III, 94. 08028 Barcelona (España/Spain).
Importado y distribuido por: **Laboratorios Bagó del Ecuador S.A.**, Quito - Ecuador.

13115323/1-2106
30116063.001