

Carvedil® 25 mg

CARVEDILOL
Comprimidos

COMPOSICIÓN

Carvedil® 25 mg
Cada comprimido contiene:
Carvedilol 25 mg
Excipientes: Celulosa microcristalina, copovidona, crospovidona, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, lactosa monohidrato c.s.

CLASIFICACIÓN

Antihipertensivo.
Agente para el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva.

INDICACIONES

Carvedil® se usa para reducir la presión arterial elevada (hipertensión) y para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva sintomática.

DOSIS Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada es:
Hipertensión arterial: Se recomienda comenzar con una dosis de 6,25 mg dos veces al día por un período de 7 a 14 días; luego puede incrementarse a 12,5 mg dos veces al día por 7 a 14 días de ser necesario.
Después de este período, la dosis puede ser ajustada hasta 25 mg cada 12 horas de ser necesario y bien tolerada. La dosis total diaria no debe exceder los 50 mg.
Insuficiencia cardíaca congestiva: La dosis usual en el adulto es de 3,125 mg dos veces al día por dos semanas. Si esta dosis es bien tolerada se puede aumentar a 6,25 mg cada 12 horas. Estas dosis pueden ser duplicadas nuevamente cada 2 semanas hasta alcanzar la más alta dosis bien tolerada por el paciente. La máxima dosis recomendada es de 25 mg dos veces al día en pacientes con menos de 85 kilos y de 50 mg dos veces al día en pacientes de mayor peso.
No administre dosis mayores o con mayor frecuencia que lo indicado por el médico.
Tome el medicamento por vía oral, con un vaso lleno de agua, de preferencia junto con los alimentos.
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto sea posible. Sin embargo, si ya casi es tiempo de la siguiente dosis, no la tome y continúe con su horario habitual.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Use sólo por indicación y bajo supervisión médica.
No suspenda el tratamiento sin antes consultar al médico.
Se debe tener precaución al conducir vehículos motorizados, operar maquinaria o realizar actividades peligrosas, puesto que el medicamento podría producir vértigo Informe al médico que está tomando Carvedil® antes de someterse a una cirugía o extracción dental Evite el consumo de bebidas alcohólicas Embarazo y lactancia: Como todo medicamento, no utilizar durante el embarazo y la lactancia, salvo expresa indicación médica.
Alergias: Informe al médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a Carvedilol o a alguna otra sustancia, tales como alimentos, preservantes o colorantes.

Niños: No existe información específica con el uso de Carvedilol en niños.
Ancianos: Los ancianos no han mostrado ser más sensibles que los adultos jóvenes a los efectos de Carvedilol. Sin embargo, ellos podrían experimentar vértigos con mayor frecuencia.
Otros medicamentos: Algunos medicamentos no pueden ser administrados el mismo tiempo con Carvedilol. Otros pueden asociarse tomando ciertas precauciones.

Consulte con médico o farmacéutico, si usted está tomando alguno de los siguientes medicamentos: Agentes antidiabéticos tales como clorpropamida, glicazide, glipizide, tolbutamida u otros; bloqueadores de los canales de calcio especialmente diltiazem o verapamilo.

CONTRAINDICACIONES

No usar en: Asma bronquial, Shock cardiogénico, Hipotensión severa, Bradicardia severa, Insuficiencia hepática severa, Insuficiencia cardíaca descompensada, Bloqueo aurículo ventricular en segundo y tercer grado, Síndrome sinusal, Pacientes alérgicos a Carvedilol.

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES

Los efectos de un medicamento pueden verse alterados por la presencia de otra enfermedad. Informe al médico si usted padece alguna enfermedad, especialmente en los siguientes casos:
Trastornos de la función renal o hepática, angina variante Prinzmetal, feocromocitoma, hipertiroidismo, enfermedades bronquiales, diabetes.

INTERACCIONES

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones).
Informe al médico todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Pueden presentarse interacciones con los siguientes medicamentos: Quinidina, fluoxetina, paroxetina, propafenona, reserpina, clonidina, digoxina, diltiazem, verapamilo, medicamentos para el tratamiento de la diabetes, otros medicamentos para el tratamiento de la hipertensión o angina.

EFFECTOS ADVERSOS (no deseados)

Todo medicamento puede producir algún efecto no deseado además de los que se pretende obtener.
Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.
Consulte inmediatamente al médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: Reacciones alérgicas (enrojecimiento de la piel, picazón), dificultad para respirar, dolor de pecho, sensación de hormigueo en las extremidades, ganancia de peso.
Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica como: dolor de cabeza. Al incorporarse rápidamente vértigos, cansancio, fatiga (sentarse o tenderse puede ayudarlo a aliviar estos efectos). No obstante si continúan o se intensifican, consulte al médico.

SOBREDOSIS

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, consulte al médico o recurra a un centro asistencial.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Como todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener en su envase original
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.
Almacenar a no más de 30°C.
NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA

Presentación:
Envase de 30 comprimidos.



Elaborado por Laboratorio Bagó de Chile S.A.,
Av. Vicuña Mackenna 1835, Santiago - Chile.
Importado y distribuido por Laboratorios Bagó del Ecuador S.A. VB1

5371477601